



MALSPASS MIT DEN DINOS




VON


SANOPI PASTEUR

















Impfkalender (Standardimpfungen) für Säuglinge, Kinder, Jugendliche und Erwachsene¹



Alter in	Wochen		Monaten								Jahren							
	6	2	3	4	5-10	11*	12	13-14	15	16-23	2-4	5-6	7-8	9-14	15-16	17	ab 18	ab 60
Impfung gegen	U4			U5	U6					U7	U7a/U8	U9	U10	U11/J1		J2		
Rotaviren	G1 ^a	G2	(G3)															
Tetanus ^b (Wundstarrkrampf)	G1		G2			G3 ^c						A1		A2				A ^e
Diphtherie ^b	G1		G2			G3 ^c						A1		A2				A ^e
Pertussis ^b (Keuchhusten)	G1		G2			G3 ^c						A1		A2				A3 ^a
Hib ^b (<i>H. influenzae</i> Typ b)	G1		G2			G3 ^c												
Poliomyelitis ^b (Kinderlähmung)	G1		G2			G3 ^c								A1				
Hepatitis B ^b	G1		G2			G3 ^c												
Pneumokokken ^b	G1		G2			G3 ^c												S ^g
Meningokokken C							G1											
Masern						G1			G2									S ^g
Mumps, Röteln						G1			G2									
Varizellen (Windpocken)						G1			G2									
HPV (Humane Papillomviren)														G1 ^d G2 ^d				
Herpes zoster																		G1 ^h C ^h
Influenza (Grippe)																		S ^g (jährlich)

Erläuterungen

G Grundimmunisierung (in bis zu 3 Teilimpfungen G1-G3)

G1 Empfohlener Impfzeitpunkt

G1 Nachholimpfzeitraum für Grund- bzw. Erstimmunisierung aller noch nicht Geimpften bzw. für Komplettierung einer unvollständigen Impfserie

A Auffrischimpfung

S Standardimpfung

a Erste Impfstoffdosis bereits ab dem Alter von 6 Wochen, je nach verwendetem Impfstoff 2 bzw. 3 Impfstoffdosen im Abstand von mind. 4 Wochen.

b Frühgeborene: zusätzliche Impfstoffdosis im Alter von 3 Monaten, d. h. insgesamt 4 Impfstoffdosen.

c Mindestabstand zur vorangegangenen Dosis: 6 Monate.

d Zwei Impfstoffdosen im Abstand von mind. 5 Monaten, bei Nachholimpfung beginnend im Alter > 14 Jahren oder bei Impfabstand von < 5 Monaten ist zwischen 1. und 2. Dosis eine 3. Dosis erforderlich.

e Td-Auffrischimpfung alle 10 Jahre. Nächste fällige Td-Impfung einmalig als Tdap- bzw. bei entsprechender Indikation als Tdap-IPV-Kombinationsimpfung.

f Einmalige Impfung mit einem MMR-Impfstoff für alle nach 1970 geborenen Personen ≥ 18 Jahre mit unklarem Impfstatus, ohne Impfung oder mit nur einer Impfung in der Kindheit.

g Impfung mit dem 23-valenten Polysaccharid-Impfstoff.

h Zweimalige Impfung mit dem adjuvantierten Herpes-zoster-Totimpfstoff im Abstand von mindestens 2 bis maximal 6 Monaten.

* Impfungen können auf mehrere Impftermine verteilt werden. MMR und V können am selben Termin oder in 4-wöchigem Abstand gegeben werden.

1. Modifiziert nach: Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (STIKO) beim Robert Koch-Institut – 2020/2021. Epid. Bull. Nr. 34/2020

342585 MAT-DE-2003531v1.0 10/2020